


Click to prove
you're human



¿Si tengo infección en la garganta y me recetaron levofloxacino, cada 8 horas; es correcta esta prescripción? yo tenía entendido que ese medicamento era para tratar infecciones renales. Hola. En efecto esta mal tratado y mal indicado su tratamiento. Las infecciones de vías respiratorias superiores NO se tratan con antibióticos además de ser del ámbito del manejo del medico general, familiar. Únicamente cuando son repetitivas, refractarias o complicadas deben de ser evaluadas por un internista quien a su vez decidirá si se envían a valoración por el infectólogo, otorrinolaringólogo o alergólogo según corresponda. Le recomiendo acudir con un medico certificado por el consejo de su especialidad o en medicina general. Cuide su salud, buen dia Dr. Jezer Lezama-Mora Efectivamente la dosis y el antibiótico no son ideales para infecciones de vías aéreas superiores. Acuda con un infectólogo que es el experto en el uso adecuado de antibióticos. Saludos cordiales y muchas gracias por su confianza. Dra. Lyssette Oserín García Buen día, ni la dosis ni el antibiótico son correctos. Le sugiero acudir con el (a) especialista en otorrinolaringología para su valoración y manejo. Saludos. Lo más recomendable es ser valorado por un otorrinolaringólogo, experto en vías aéreas superiores. En el caso de ser amigdalitis el problema el medicamento indicado no es de primera elección. Es mejor revalorar y hacer un buen diagnóstico. Saludos cordiales y muchas gracias por su confianza. Qué tal, permítame contestar tu pregunta. 1. Los antibióticos tienen respuestas a múltiples agentes bacterianos y aunque existen tratamientos empíricos la antibiótico terapia es útil en múltiples infecciones de acuerdo al agente causal incluso cierto tipo de quinolonas para infecciones de vía respiratoria superior. 2.Las amigdalitis' suponiendo que tu diagnóstico sea correcto, de acuerdo a la causa es el tratamiento que puede ser desde sintomático hasta antibiotioterapia de amplio espectro. 3. El tratamiento que no a refieres estoy totalmente desacuerdo que no sólo está errado si no muy mal dosificado que lejos de ayudar puede incluso hasta afectarte. Te pido que los problemas de salud que pueda usted desarrollar acuda con un médico especialista certificado, su salud es importante. Espero mejor pronto. Saludos cordiales y muchas gracias por su confianza. Dr. Adriana Herrera Cota Hola, te recomiendo acudir con un otorrinolaringólogo para revaloración y ajuste de tratamiento, la mayor parte de las infecciones de vías respiratorias no requieren antibiótico y se puede generar resistencia bacteriana por un uso incorrecto. Lindo día, Niza Harari Masri Buenas tardes. El antibiótico que está tomando no es el ideal para una infección de vías aéreas superiores no complicada o refractaria. La dosis tampoco es correcta. Le sugiero acude con un otorrinolaringólogo para una valoración . Saludos cordiales y muchas gracias por su confianza. Todos los contenidos publicados en Doctoralia, especialmente preguntas y respuestas, son de carácter informativo y en ningún caso deben considerarse un sustituto de un asesoramiento médico. El levofloxacino es un antibiótico indicado para el tratamiento de infecciones bacterianas, como sinusitis, neumonía, erisipela, forúnculos o infección del tracto urinario, lo que actúa eliminando bacterias del organismo, sensibles a este antibiótico. Este medicamento puede encontrarse en farmacias o droguerías en forma de tabletas de 500 mg o 750 mg, bajo los nombre comerciales Bredelin, Elequine o Sibifox, por ejemplo, o como genérico "levofloxacino", y debe usarse bajo indicación médica, siendo vendido solo con la presentación de receta médica. Además, el levofloxacino también puede encontrarse en presentación inyectable, la cual debe ser aplicada por un enfermero en hospitales. Para qué sirve El levofloxacino está indicado para el tratamiento de infecciones bacterianas como: Sinusitis aguda; Neumonia; Impétigo; Abscesos en la piel; Forúnculo; Celulitis bacteriana; Erisipela; Osteomielitis; Infecciones del tracto urinario, como pielonefritis; Infecciones intraabdominales; Infección generalizada o sepsis. Además, el levofloxacino puede indicarse para el tratamiento de exacerbaciones agudas de bronquitis crónica. ¿El levofloxacino puede usarse para COVID-19? El levofloxacino puede ser indicado por el médico en personas con COVID-19 y que tengan al mismo tiempo neumonía bacteriana, ya que este medicamento ayuda a combatir bacterias. Sin embargo, el levofloxacino no tiene ninguna acción contra virus, incluso el coronavirus, no estando indicado cuando no hay infecciones bacterianas asociadas. Vea los principales medicamentos indicados para el tratamiento de COVID-19. Cómo tomar levofloxacino El levofloxacino en presentación de tabletas debe tomarse por vía oral, con un vaso de agua, antes o después de una comida, en los horarios establecidos por el médico. Sin embargo, personas que utilizan medicamentos como sales de hierro, antiácidos o sucralfato, deben tomar la tableta de levofloxacino 2 horas antes o 2 horas después del uso con este tipo de medicamentos. La dosis de levofloxacino varía de acuerdo al tipo de infección a tratar, siendo que las dosis normalmente recomendadas para adultos, son: El tiempo de tratamiento con levofloxacino debe ser siempre orientado por el médico de acuerdo a la condición a tratar. Posibles efectos secundarios Los efectos secundarios más comunes que pueden surgir durante el tratamiento con levofloxacino son náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, mareos, insomnio o dolor abdominal. Además, también puede haber ruptura del tendón de Aquiles, convulsiones, alucinaciones, agitación, ansiedad, alteración en el gusto, pancreatitis, formación de bolitas en la piel, comezón, urticaria, dolor en el cuerpo, debilidad muscular, malestar, fiebre o alteraciones en la función del hígado. Contraindicaciones El levofloxacino debe evitarse en niños, adolescentes, mujeres embarazadas o que estén lactando, así como en personas que tengan epilepsia, antecedentes de tendinitis o ruptura en el tendón. Además, este medicamento no debe usarse en personas que tengan alergia al levofloxacino o a otras fluoroquinolonas, como ciprofloxacino o norfloxacin, por ejemplo, o a cualquier otro componente de la fórmula. Levofloxacino Stada es un medicamento ampliamente utilizado para combatir infecciones bacterianas en diferentes partes del cuerpo. Su principio activo es el levofloxacino, un potente antibiótico que pertenece al grupo de las fluoroquinolonas. Este medicamento se utiliza en el tratamiento de infecciones en los tejidos paranasales, los pulmones, el tracto urinario, la próstata y la piel. Antes de empezar a tomar Levofloxacino Stada, es importante que tengas en cuenta algunas precauciones. Debes informar a tu médico si eres alérgico al levofloxacino o a otros antibióticos similares. También debes tener cuidado si has tenido problemas en los tendones relacionados con el uso de antibióticos, si tienes epilepsia, si eres un niño o adolescente en período de crecimiento, si estás embarazada o en período de lactancia, entre otros. Además, si tienes más de 60 años, estás usando corticosteroides, has tenido un trasplante, tienes problemas de riñón, problemas de salud mental, problemas de corazón, diabetes, problemas de hígado, miastenia gravis, trastorno de los nervios periféricos o antecedentes de enfermedades cardiovasculares o factores de riesgo, debes tener precaución. Para asegurar la eficacia del tratamiento con Levofloxacino Stada, es importante seguir las instrucciones de administración indicadas por tu médico. Debes tomar los comprimidos enteros con un poco de agua, durante o entre las comidas. Si estás tomando otros medicamentos, debes tener en cuenta las posibles interacciones y tomar el levofloxacino a una distancia de tiempo adecuada. Como con cualquier medicamento, Levofloxacino Stada puede tener efectos adversos. Los efectos adversos más comunes incluyen problemas de sueño, dolor de cabeza, malestar, náuseas, diarrea y elevación de algunas enzimas del hígado en la sangre. Sin embargo, también existen efectos adversos graves y raros, como reacciones alérgicas, dolor e inflamación en los tendones o ligamentos, ataques epilépticos, depresión, erupción generalizada y disminución de los niveles de azúcar en sangre. Si experimentas alguno de estos efectos adversos, es importante que te pongas en contacto con tu médico de inmediato. Ahora que conoces más sobre Levofloxacino Stada y cómo utilizarlo de forma segura, es importante destacar algunas pautas para el uso adecuado de antibióticos en general. Recuerda seguir las instrucciones de tu médico y completar todo el curso de tratamiento prescrito, incluso si te sientes mejor antes de tiempo. No guardes ni compartas los antibióticos sobrantes. Siempre consulta a tu médico o farmacéutico si tienes alguna pregunta o inquietud. Además de tomar medicamentos cuando sea necesario, es importante que tomes medidas para prevenir infecciones. Lávate las manos regularmente con agua y jabón, cubre tu boca y nariz al toser o estornudar, evita el contacto cercano con personas enfermas y mantén una buena higiene personal. Preguntas frecuentes 1. ¿Cómo debo tomar Levofloxacino Stada? Debes tomar los comprimidos con un poco de agua, durante o entre las comidas. Sigue las instrucciones de administración indicadas por tu médico. 2. ¿Cuáles son los posibles efectos adversos de Levofloxacino Stada? Los efectos adversos más comunes incluyen problemas de sueño, dolor de cabeza, malestar, náuseas, diarrea y elevación de algunas enzimas del hígado en la sangre. Sin embargo, también pueden producirse efectos adversos graves y raros, como reacciones alérgicas, dolor e inflamación en los tendones o ligamentos, ataques epilépticos, depresión, erupción generalizada y disminución de los niveles de azúcar en sangre. 3. ¿Qué debo hacer si experimento algún efecto adverso? Si experimentas algún efecto adverso mientras tomas Levofloxacino Stada, debes comunicarte con tu médico de inmediato. No debes interrumpir el tratamiento sin consultar primero con un profesional de la salud. Tu médico podrá evaluar tu condición y ajustar el tratamiento si es necesario. Leer también: Cómo Tomar Citorsal: Ficha Técnica y Modo de UsoConclusión: Levofloxacino Stada es un medicamento efectivo utilizado para el tratamiento de diversas infecciones bacterianas. Sin embargo, es importante tomarlo siguiendo las indicaciones de tu médico y teniendo en cuenta las precauciones necesarias. No dudes en consultarlo si tienes alguna pregunta o inquietud. Recuerda siempre completar el curso de tratamiento prescrito y tomar medidas para prevenir infecciones. Fuente de la información: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios cima.aemps.es Buen día una pregunta me recetaron levofloxacino 750 mg para una infección de garganta tomar 1 cada 24 horas es correcta la dosis y es que soy hipertenso Hola, lo mejor no es usar antibiótico para infecciones repiratorias altas, son frecuentes que son por virus. La dosis depende de si el riñón tiene una depuración normal. Actualizado el 23 de octubre de 2022 por Carlos José Belmonte López El levofloxacino está en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Eso por si mismo habla de la importancia que reviste este antibiótico. Indicado con frecuencia para tratar severas infecciones respiratorias y urinarias, cada vez está cobrando más auge dado los buenos resultados que se logran cuando se administran a los pacientes que lo requieren. Lo más probable es que hayas escuchado mencionar el levofloxacino alguna vez. Pues bien, ha llegado el momento de conocer al medicamento tras ese nombre, develar sus beneficios, usos y precauciones al emplearlo. Fórmula del levofloxacino Fórmula: C18H20FN3O4Vida media: 8 horasMetabolismo: RenalCIClo: 6 horasCIE: C EE, UU Pesa: mol 361,368 g/molVías de adm.: Oral, IV y oftálmicaExcreción: Urinaria El levofloxacino es un antibiótico que pertenece a una clase llamada fluoroquinolonas, ha demostrado su efectividad frente a microorganismos gramnegativos y grampositivos, aunque tiene una actividad moderada frente a anaerobios. La levofloxacina es eficaz para combatir una serie de infecciones producidas por muchos gérmenes como el staphylococcus aureus, streptococcus pneumoniae, streptococcus pyogenes, enterobacter cloacae, escherichia coli, haemophilus spp., klebsiella pneumoniae, legionella pneumophila, moraxella catarrhalis y proteus mirabilis. El levofloxacino cuenta con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos para el tratamiento de ciertas infecciones. Entre las aplicaciones médicas que se dan al levofloxacino se encuentran estas: Infecciones respiratorias. Tales como: exacerbación aguda de bronquitis crónica, neumonía adquirida en comunidad y sinusitis bacteriana aguda, pero no funciona para combatir resfriados, influenza u otras infecciones virales. Infecciones del tracto urinario. Entre ellas la prostatitis bacteriana crónica, cistitis no complicadas y la pielonefritis.Infecciones en la piel y tejidos blandos. Tal es el caso de los abscesos, celulitis y manchas rojas en la cara con presencia de fiebre.Otros usos. En ocasiones se emplea para tratar la endocarditis, una infección de las válvulas y el revestimiento del corazón, algunas enfermedades de transmisión sexual, infección por salmonella, tuberculosis y la diarrea del viajero. También se emplea para tratamiento y profilaxis tras inhalación de ántrax. Aunque usualmente este medicamento se toma una vez al día, la duración del tratamiento y las dosis dependerá del tipo de infección que se combata. Por eso, es imperioso seguir las instrucciones médicas. Este fármaco se encuentra disponible en formatos de tabletas, solución para tomar por vía oral y suspensión inyectable, con las siguientes características: Tabletas. La tableta se puede tomar con o sin alimentos. Se consiguen en presentación de 250 mg, 500 mg y 750 mg, en presentación de cajas con 1, 3, 5, 7, 10, 14, 20, 24 y 30 piezas. Las marcas comerciales más populares son: Elequine, Lefloxin, Flexox, Bredelin y Tavanic.Solución oral. Se debe tomar 1 o 2 horas antes de comer.Suspensión inyectable. En concentraciones de 500 mg, 750 mg en 20 ml, 30 ml, en envases con 1, 3 y 6 ampollas. Se administra mediante perfusión intravenosa lenta una o dos veces al día. Se encuentran disponibles bajo marcas comerciales como: Tavanic, Elequine y Bredelin. Como referencia, a continuación se señala la posología y forma de administración según la gravedad de algunas enfermedades: Infecciones complicadas del tracto urinario. Se recomienda administrar 500 mg una vez al día, por un espacio de tiempo de 7 a 14 días.Cistitis no complicadas. La recomendación es consumir 250 mg una vez al día, por un lapso de 3 díasProstatitis bacteriana crónica. Se sugiere tomar 500 mg una vez al día, por 28 días.Sinusitis bacteriana aguda. Tomar 500 mg una vez al día, de 10 a 14 díasExacerbación bacteriana aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ingerir 500 mg una vez al día, de 7 a 10 días.Neumonía adquirida en la comunidad. Se sugiere tomar 500 mg una o dos veces al día, por 7 a 14 días.Pielonefritis aguda. Se recomienda tomar 500 mg una vez al día, por 7 a 10 días.Antrax por inhalación. Seel indicarse 500 mg una vez al día, por 8 semanas. La Asociación Española de Pediatría hace las siguientes recomendaciones: Vía oral o intravenosa. Durante 7 a 14 días. Lactantes >6 meses y niños 5 años. 10 mg/kg/dosis cada 24 horas, con dosis máxima 750 mg por día. Los antibióticos como el levofloxacino mejoran la calidad de vida de las personas que pasan por la ingrata experiencia de padecer enfermedades infecciosas. Sin embargo, en vista de que la automedicación nunca es un buen recurso, es preciso buscar orientación de un médico o de un farmacéutico antes de emplear el levofloxacino. Las ventajas y desventajas de su uso se exponen a continuación. Es un medicamento de fácil acceso.Es efectivo para mejorar algunas infecciones respiratorias graves.Se usa con éxito para tratar infecciones urinarias.Ha demostrado su efectividad para la atención de algunas infecciones de la piel y tejidos blandos. Se prueba su uso moderado y bajo supervisión médica en pacientes pediátricos. Las quinolonas, como el levofloxacino, pueden causar reacciones de fotosensibilización en algunos pacientes. En algunas personas, el tratamiento con quinolonas puede provocar convulsiones. Aunque se perciban beneficios de este medicamento, hay algunas precauciones a tomar en cuenta si va a recibir tratamiento con levofloxacino, por ejemplo: Como el tratamiento con quinolonas puede provocar convulsiones, debe utilizarse con precaución en pacientes con trastornos del sistema nervioso central.Hay que evitar la exposición a radiaciones ultravioletas, la luz solar intensa o de manera prolongada durante el tratamiento con este medicamento.Los pacientes con deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa son propensos a sufrir reacciones hemolíticas al ser tratados con quinolonas.Se recomienda diferir alcohol de 2 horas entre la administración de antiácidos con magnesio o aluminio, comprimidos de dadanosina, sucralfato y agentes con hierro o zinc y la administración de levofloxacino.Puede disminuir el umbral convulsivo si se administra en combinación con teofilina, antiinflamatorios no esteroideos u otros fármacos proconvulsivantes. Los efectos adversos que el levofloxacino puede producir son: Náuseas Vómitos Dolor abdominal DiarreaAumento de transaminasasMareos ConvulsionesFotosensibilidad Las enfermedades causadas por microorganismos continúan segando vidas por todo el mundo. Afortunadamente, medicamentos como el levofloxacino han demostrado su eficacia para el combate de estas patologías. Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o profesionales sanitarios y la información contenida en PharmaSalud está redactada por profesionales en medicina, recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario. Publicidad Otros Artículos Populares Si has tenido alguna infección bacteriana, es probable que hayas escuchado sobre el levofloxacino, un antibiótico ampliamente utilizado para tratar diferentes tipos de infecciones. En esta nota, te contaremos para qué sirve el levofloxacino, qué infecciones puede tratar, qué debes evitar mientras lo tomas, cómo se compara con otros antibióticos y si es útil para las infecciones de garganta. Foto: iStock¿Qué tipo de infecciones ataca el levofloxacino?De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el levofloxacino se utiliza para tratar algunas infecciones de riñón, de la piel, próstata e incluso neumonía. El levofloxacino pertenece a una clase de antibióticos llamados fluoroquinolonas, que son efectivos contra un amplio espectro de bacterias y en un sentido más amplio, puede ser utilizado para:Infecciones respiratorias: Como la bronquitis aguda y crónica, neumonía y sinusitis.Infecciones del tracto urinario: Como la cistitis, pielonefritis y uretritis.Infecciones de la piel y tejidos blandos: Como celulitis, abscesos y heridas infectadas.Infecciones gastrointestinales: Como la infección por Helicobacter pylori en úlceras gástricas. Es importante señalar que el levofloxacino es un antibiótico de uso restringido y debe ser recetado por un médico. No se debe tomar para tratar infecciones virales, como el resfriado común o la gripe, ya que no sería efectivo.Foto: iStock¿Qué no se debe comer cuando se toma levofloxacino?Según los expertos, cuando se toma levofloxacino, es importante seguir ciertas recomendaciones sobre la dieta para garantizar la efectividad del medicamento y evitar posibles interacciones negativas. Por ejemplo, es mejor evitar el consumo de productos lácteos, suplementos de calcio, hierro, zinc o magnesio, así como antiácidos que contengan aluminio o magnesio, al menos dos horas antes o después de tomar el levofloxacino.Estos productos pueden interferir con la absorción del antibiótico en el cuerpo y reducir su efectividad.También se aconseja evitar el consumo de cafeína, ya que puede aumentar la posibilidad de efectos secundarios nerviosos y cardíacos.Además, es fundamental seguir las indicaciones del médico en cuanto a la dosis y la duración del tratamiento, incluso si los síntomas de la infección han desaparecido, para evitar el desarrollo de resistencia bacteriana.Foto: iStock¿Qué es mejor para una infección urinaria, ciprofloxacina o levofloxacino?Tanto la ciprofloxacina como el levofloxacino son antibióticos del grupo de las fluoroquinolonas y son efectivos para tratar infecciones del tracto urinario.La elección entre uno u otro dependerá de varios factores, como la sensibilidad del organismo a los medicamentos, la gravedad de la infección y la historia médica del paciente.En algunos casos, el médico puede prescribir la ciprofloxacina como primera opción para infecciones urinarias, mientras que el levofloxacino puede ser preferido en casos de resistencia bacteriana o si se necesita una cobertura más amplia contra ciertas bacterias.Ambos antibióticos tienen efectividad similar en el tratamiento de infecciones urinarias, pero la decisión final debe ser tomada por un profesional de la salud en función de la evaluación individual de cada paciente.Foto: iStockEl levofloxacino ayuda contra la infección de garganta¿El levofloxacino puede ser eficaz para tratar infecciones bacterianas de garganta, como la faringitis estreptocócica, pero generalmente no es el primer medicamento de elección para este tipo de infecciones.La faringitis estreptocócica, causada por la bacteria Streptococcus pyogenes, suele tratarse con antibióticos de penicilina o amoxicilina, que son más efectivos y seguros para esta infección en particular.Sin embargo, en casos de alergia a la penicilina o resistencia a estos medicamentos, el levofloxacino puede ser una alternativa.Es importante destacar que no se debe automedicar ni tomar levofloxacino sin la prescripción y supervisión de un médico, ya que el uso incorrecto de este antibiótico puede tener efectos negativos para tu salud.Foto: iStock¿Cuáles son los riesgos del levofloxacino?El levofloxacino, al igual que otros antibióticos de la clase de las fluoroquinolonas, puede tener varios riesgos y efectos secundarios. Algunos de los posibles riesgos incluyen:Tendinitis y ruptura de tendones: Existe un riesgo de desarrollar tendinitis (inflamación del tendón) y, en casos raros, ruptura de tendones, especialmente en personas mayores y en aquellas que realizan actividad física intensa. Problemas en el sistema nervioso: Pueden ocurrir efectos secundarios en el sistema nervioso, como mareos, confusión, alucinaciones y convulsiones. Estos efectos son más frecuentes en personas mayores y pueden ser permanentes en algunos casos. Reacciones alérgicas: Al igual que con cualquier medicamento, pueden ocurrir reacciones alérgicas que varían en gravedad. Estas pueden incluir erupciones cutáneas, picazón, hinchazón y dificultad para respirar. Afectación del sistema gastrointestinal: Pueden ocurrir problemas gastrointestinales como diarrea, náuseas y vómitos. Efectos en los niveles de glucosa: En algunos casos, el levofloxacino puede afectar los niveles de glucosa en sangre, lo que puede ser problemático para personas con diabetes. Ahora que ya sabes más sobre el levofloxacino, para qué sirve y cuáles son sus riesgos, es fundamental que sea utilizado bajo supervisión médica y siguiendo las indicaciones del profesional de la salud.Si quieres saber más sobre las infecciones urinarias, te compartimos este video. Tomar levofloxacino aumenta el riesgo de que desarrolle tendinitis (inflamación de un tejido fibroso que conecta un hueso con un músculo) o de sufrir ruptura de un tendón (desgarro del tejido fibroso que conecta el hueso al músculo) durante su tratamiento o hasta varios meses después. Estos problemas pueden afectar los tendones del hombro, la mano, la parte posterior del tobillo u otras partes del cuerpo. La tendinitis o la ruptura de un tendón puede ocurrir a cualquier edad, pero el riesgo es mayor en personas mayores de 60 años. Informe a su médico si alguna vez tuvo un trasplante de riñón, corazón o pulmón; enfermedad renal, un trastorno de las articulaciones o tendones, como artritis reumatoide (una afección en la que el cuerpo ataca sus propias articulaciones, ocasionando dolor, inflamación y pérdida de la función) o si participa en alguna actividad física regular. Informe a su médico o farmacéutico si está usando esteroides orales o inyectados como dexametasona, metilprednisolona (Medrol) o prednisona (Rayos). Si experimenta alguno de los siguientes síntomas de tendinitis, deje de tomar el levofloxacina, descanse y llame a su médico inmediatamente: dolor, inflamación, sensibilidad, rigidez o dificultad para mover un músculo. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas de ruptura de tendón, deje de tomar levofloxacina y busque tratamiento médico de emergencia: escucha o siente un chasquido o estallido en el área de un tendón, aparecen moretones después de una lesión en el área de un tendón o tiene incapacidad para moverse o sostener peso en un área afectada.Tomar levofloxacina puede causar cambios en la sensación y daño a los nervios que podría o no desaparecer después de dejar de tomar la levofloxacina. Este daño puede ocurrir poco tiempo después de empezar a tomar la levofloxacina. Informe a su médico si alguna vez ha tenido neuropatía periférica (un tipo de daño a los nervios que causa hormigueo, adormecimiento y dolor en manos y pies). Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, deje de tomar levofloxacina y llame a su médico de inmediato: adormecimiento, hormigueo, dolor, ardor o debilidad en los brazos o piernas; o un cambio en su capacidad para sentir el tacto ligero, vibraciones, dolor, calor o frío. Tomar levofloxacina puede afectar su cerebro o su sistema nervioso y causar graves efectos secundarios. Esto puede ocurrir después de la primera dosis de levofloxacina. Informe a su médico si tiene o ha tenido convulsiones, epilepsia, arterioesclerosis cerebral (estrechamiento de los vasos sanguíneos en o cerca del cerebro que puede causar un accidente cerebrovascular o mini accidente cerebrovascular), accidente cerebrovascular, cambios en la estructura del cerebro o enfermedad renal. Si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas, deje de tomar levofloxacina y llame a un médico de inmediato: convulsiones, temblores, mareos, aturdimiento, dolores de cabeza que no desaparecen (con o sin visión borrosa), dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido, pesadillas, no confiar en otras personas o sentir que otras personas quieren lastimarlos; alucinaciones (ver cosas o escuchar voces que no existen); pensamientos o acciones para lastimarse o quitarse la vida; sentirse tranquilo, ansioso, nervioso, deprimido, o confundido, problemas de memoria o bien, otros cambios en el estado de ánimo o en el comportamiento.Tomar la levofloxacina puede empeorar la debilidad muscular en las personas con miastenia gravis (un trastorno del sistema nervioso que ocasiona debilidad muscular) y causar dificultad para respirar grave o la muerte. Informe a su médico si padece de miastenia gravis. Su médico podría indicarle que no tome levofloxacina. Si tiene miastenia gravis y su médico le dice que tiene que tomar levofloxacina, llame a su médico de inmediato si experimenta debilidad muscular o dificultad para respirar durante su tratamiento.Hable con su médico sobre los riesgos de tomar levofloxacina.Su médico o farmacéutico le dará la información del fabricante para el paciente (Guía del medicamento) cuando inicie su tratamiento con levofloxacina. Lea detenidamente la información y pídale a su médico o a su farmacéutico que le aclaren cualquier duda. También puede visitar el sitio web de la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) (o el sitio web del fabricante para obtener la Guía del medicamento. Me recetaron Levofloxacino 750 mg cada 12 horas para una infección en la garganta, es correcta la dosis? Hola, en la medida de lo posible es mejor evitar antibióticos, los cuadros respiratorios altos el 80% es de origen viral. La dosis esta al doble, además que la función renal tiene que revisarse antes del medicamento, para dejar la dosis correcta.